


Conduite à tenir face à la découverte d'une sérologie Hépatite C positive



- (1) Dans les populations à risques élevés (toxicomanes, dialysés,...) ou chez les Immuno déprimés, ou en cas d'hépatite aiguë, la recherche du VHC par PCR doit être entreprise d'emblée.
- (2) Les transaminases sont considérées comme normales si < seuil lors d'un contrôle mensuel sur une période de 6 mois.
- (3) La détermination du génotype permet l'estimation de la durée du traitement, schématiquement 48 semaines pour les génotypes 1,4,(5,6) et 24 semaines pour les génotypes 2 ou 3.
- (4) Lorsque les transaminases sont normales, les lésions hépatiques sont le plus souvent minimes ou absentes. Cependant on peut observer parfois des lésions histologiques importantes, raisons pour laquelle la PBH est pratiquée quelquefois malgré des transaminases normales ou dans le cadre d'un protocole de recherche clinique.
- (5) En présence d'une symptomatologie extra-hépatique (vasculaire, GN, cryoglobulinémie mixte,...), discuter une indication thérapeutique → avis spécialisé.

Source schéma : Prométhée Alpes Réseau Hépatite C - Syndicat des biologistes de l'Isère

Données en accord avec les recommandations de la conférence de consensus française du 27 et 28 février 2002 - Paris

ORDONNANCES MÉDICALES - DÉPISTAGE VIH-HÉPATITE C



Ordonnances médicales

dépistage

VIH - HÉPATITE C

Office Départemental de Prévention du Sida
Centre Départemental de Santé

23, avenue Albert 1er de Belgique - 38000 Grenoble
Tél/Fax : 04 76 87 83 09 - Email : odps@club-internet.fr

Le dépistage VIH-Sida : Que faire ? Quand le faire ?

Moment où vous avez pu prendre un risque



En cas de risque important :

un traitement d'urgence peut être proposé par un médecin, dans les heures qui suivent le risque : il peut éviter la contamination.



A partir du 15^{ème} jour après le risque, il est possible de faire un premier test :

- s'il est négatif, ce résultat doit être confirmé, 3 mois après le risque.
- s'il est positif, la contamination est certaine. Un traitement peut être envisagé avec un médecin.




3 mois après le risque :

seul un test négatif réalisé 3 mois après le risque, confirme qu'il n'y a pas eu de contamination.

Etapes et pratiques du dépistage du VIH

- Consultation avec un médecin
- Information - conseils personnalisés
- Evaluation du risque avec la personne



Source : Plaquelette d'information "Test du Sida, ce qui change" - ODPS Groupe Dépistage